



L'auto-prélèvement est indiqué pour la recherche de streptocoque du groupe B chez la femme enceinte et la recherche de *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* et *Mycoplasma genitalium* par PCR.

*Noter nom, prénom, date de naissance sur le flacon à bouchon rose.*

*Remplir la fiche de transmission de prélèvement (C2-ENR-002) jointe à l'écouvillon sans oublier la DATE et l'HEURE du prélèvement.*

- 1- Ne pas effectuer ce prélèvement pendant les règles.
- 2- **Ne pas faire** de toilette intime avant le recueil.
- 3- Sortir l'écouvillon ESWAB de son sachet sans toucher la mousse ni la partie sous le trait rouge.



- 4- Tenir l'écouvillon d'une main en dirigeant la mousse vers soi (figure2).
- 5- Avec l'autre main, écarter les grandes lèvres et insérer l'écouvillon dans le vagin (figure 3), en effectuant une légère rotation.
- 6- S'assurer que l'écouvillon touche bien les parois vaginales et effectuer une rotation pendant 10 à 15 secondes.
- 7- Retirer l'écouvillon sans toucher la peau.
- 8- Dévisser le bouchon rose du tube et plonger l'écouvillon dans le liquide (ce liquide trouble est un conservateur).
- 9- Casser l'écouvillon au niveau du trait rouge, en le laissant dans le liquide et revisser le bouchon.
- 10- Rapporter rapidement l'écouvillon au laboratoire dans la pochette plastique. Après le recueil, cet écouvillon peut être conservé au maximum 24 heures à température ambiante.